


對抗黴菌毒素的多重陽離子產品

從巴西純淨礦山中開採煉製的**好勒儂® LUMINOS**，是變質岩層經過大自然作用後，轉換成為豐富蒙脫石(高嶺土)含量的膨潤土組成。

好勒儂®含大量並多重陽離子，具有強大的陽離子交換能力，能自然親和具極性的黴菌毒素，卻不會影響飼料中的礦物質和維生素等重要營養元素。

好勒儂®的多孔結構能吸收大量的水分，增加飼料體積比例，延長飼料通過腸道的時間，讓動物有更多的時間消化飼料，並吸收其中的養分。



如何分辨礦物性黴菌毒素吸附劑的優劣？	好勒儂® LUMINOS	優良黴菌毒素吸附劑的 參考數值
水分, %	11	≤ 13
顆粒大小, μm	94	≤ 100
密度, g/ cm ³	0.90	0.90 ~ 1.10
酸鹼值	7.4	≥ 6
吸水力, mL	8.5	≥ 8
對亞甲基藍的吸附力 (mL/0.5g)	52	≥ 50

作用模式

- ❖ 表面積大，表層有多重陽離子，可以吸附具極性的黴菌毒素。
- ❖ 藉由消除黴菌毒素，調節腸道微生物組相，減輕腹瀉。
- ❖ 強大的吸水力，減緩飼料通過腸道的速度。
- ❖ 高劑量下不會影響動物的生產績效。
- ❖ 增加飼料換肉率，並使腸道上皮細胞更健康。
- ❖ 確保飼料和食品安全。
- ❖ 提升動物福祉並正向發展養殖產業。
- ❖ 增加飼料營養和各項資源的利用率
- ❖ 在胃腸道各處都有高吸附力。
- ❖ 取材精選蒙脫土，是高純度的膨潤土。
- ❖ 只有特定地區才能開採到這種膨潤土，而且不含有任何工業污染物。


產品特性




物理性分析

色澤	膚色至淺棕色
顆粒大小均值	細粉末
戴奧辛和呋喃	< 0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
砷	< 12.0 ppm
汞	< 0.1 ppm
銅	< 5.0 ppm
鉛	< 15.0 ppm
符合歐盟規範 2002/32/EC	

好勒黴 Vs. 黃麴毒素
肉雞體重 (公克)



好勒黴 Vs. 陰性對照
肉雞體重 (公克)



用法用量/每公噸飼料		
家禽	肉雞	2.0-5.0 公斤
	種雞/蛋雞	2.0-5.0 公斤
豬隻	小豬	2.0-5.0 公斤
	成長豬/肥育豬	2.0-5.0 公斤
	母豬(妊娠期/哺乳期)	2.0-5.0 公斤
牛隻	犢牛	2.0-5.0 公斤
	乳牛	2.0-5.0 公斤
	肉牛	2.0-5.0 公斤

低劑量僅用以預防黴菌毒素的危害。
黴菌毒素含量高或未知含量時，建議使用
高劑量。
遵照營養師/獸醫師的指示使用

包裝：

25公斤紙袋內襯塑膠層
1000公斤大包裝

保質期：

生產日期後36個月

儲存：

存放在陰涼乾燥處