


對抗黴菌毒素的多重陽離子產品

從巴西純淨礦山中開採煉製的**好勒黴®**，是變質岩層經過大自然作用後，轉換成為豐富蒙脫石(高嶺土)含量的膨潤土後組成。

好勒黴®含大量並多重陽離子，具有強大的陽離子交換能力，能自然親和具極性的黴菌毒素，卻不會影響飼料中的礦物質和維生素等重要營養元素。

好勒黴®的多孔結構能吸收大量的水分，增加飼料體積比例，延長飼料通過腸道的時間，讓動物有更多的時間消化飼料，並吸收其中的養分。



作用模式

- ❖ 表面積大，表層有多重陽離子，可以吸附具極性的黴菌毒素，在胃腸道各處都有高吸附力。
- ❖ 調節腸道微生物菌相，減輕腹瀉，與其他添加劑協同作用，增加飼料換肉率，並使腸道上皮細胞更健康。
- ❖ 高劑量下不會影響動物的生產績效。
- ❖ 不受高熱破壞，確保飼料和食品安全。
- ❖ 100%純天然添加劑，強大的吸水力，減緩飼料通過腸道的速度。
- ❖ 增加飼料營養和各項資源的利用率。
- ❖ 取材自特定地區精選高純度蒙脫土，不含有任何工業污染物。
- ❖ 提升動物福祉，並正向發展養殖產業。

物理性分析

色澤	膚色至淺棕色
顆粒大小均值	細粉末
戴奧辛和呋喃	< 0.75 ng OMS-PCDD/F-TEQ/kg
砷	< 12.0 ppm
汞	< 0.1 ppm
鎘	< 5.0 ppm
鉛	< 15.0 ppm
符合歐盟規範 2002/32/EC	

如何分辨礦物性黴菌毒素 吸附劑的優劣？

好勒黴®
LUMINOS

優良黴菌毒素 吸附劑的參考數值

水分, %	11	≤ 13
顆粒大小, μm	94	≤ 100
密度, g/ cm ³	0.90	0.90 ~ 1.10
酸鹼值	7.4	≥ 6
吸水力, mL	8.5	≥ 8
對亞甲基藍的吸附力 (mL/0.5g)	52	≥ 50



黴菌毒素吸附劑

產品說明：

「好勒微®」是一種水合鈉鈣鋁矽酸鹽，它在體內結合黴菌毒素形成複合物，使毒素經過消化道時不被吸收，是一種直接隨著吸附劑排出體外的物質，不會影響維生素與礦物質的吸收。

產品組成：

精選巴西最佳礦石100%純天然水合鈉鈣鋁矽酸鹽，是聚陽離子的蒙脫石，有著最理想的大比表面積(great specific surface area)離子交換能力。

技術分析值 (註冊規格)：

水份	最高	13%
二氧化矽	最低	54%
氧化鋁	最低	20%
氧化鐵	最低	7%
氧化鎂	最低	3.5%
氧化鈣	最低	0.6%
氧化鈉	最低	0.1%
碘化鉀	最低	0.1%

礦物質含量：

鈣	0.90%	鉀	0.70%
磷	0.70%	鋅	0.01%
鈉	0.10%	鎂	0.20%

品管分析指標：

粒度測定200網孔篩分析	最高	15%
膨脹指數	最低	8 mL
原始亞甲基藍吸附 (AAM)	最低	50 mL

微生物分析：

沙門氏菌	25公克不得檢出
大腸桿菌	1公克不得檢出

污染物與重金屬含量：

戴奧辛與四氯呋喃	不高於 (歐盟標準)	戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和 每公斤0.75納克
砷(註)	不高於	12 ppm
汞	不高於	0.1 ppm
銅	不高於	5 ppm
鉛	不高於	15 ppm

註：以下是台灣農委會飼料重金屬含量標準

砷	12 ppm	銅	10 ppm
汞	0.5 ppm	鉛	50 ppm

物理性狀：

顏色	淡米色至淡棕色
平均顆粒大小	細緻粉末

包裝：

25公斤裝，內襯聚乙烯層的紙袋

貯存條件：

陰涼、乾燥、無昆蟲處

產品效期：

製造後36個月

每公噸飼料中使用劑量

 家禽	肉雞	2.0-5.0 公斤
	種雞/蛋雞	2.0-5.0 公斤
 豬隻	小豬	2.0-5.0 公斤
	成長豬/肥育豬	2.0-5.0 公斤
	母豬(妊娠期/哺乳期)	2.0-5.0 公斤
 牛隻	犏牛	2.0-5.0 公斤
	乳牛	2.0-5.0 公斤
	肉牛	2.0-5.0 公斤

或依照營養師的建議使用